



نتایجی در مورد مدولهای کوهمولوژی خاص با تکیه گاه کراندار

میرصادق سیدصادقی^(۱)، سیدحمید مسعودی پورلیر^(۲) و میریوسف صادقی^(۳)

(۱) گروه ریاضی، دانشگاه پیام نور، ص.پ. ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵، تهران، ایران
(۲) دانشجوی دکتری، گروه ریاضی، دانشگاه پیام نور، ص.پ. ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵، تهران، ایران
(۳) گروه ریاضی، دانشگاه پیام نور، ص.پ. ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵، تهران، ایران

دبیر مسئول: امیدعلی شهنی کرمزاده

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۱/۱۷

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱۲/۱۷

چکیده: فرض کنید R یک حلقه یکدار، جابجایی و نوتری، J ایده‌الی از R و d عددی صحیح و نامنفی باشد. برای R -مدول M ، $\Gamma_{d,J}(M)$ مجموعه همه x هایی از M است که در شرط $Ix \subseteq Jx$ برای ایده‌ال I از R با ویژگی $\dim(R/I) \leq d$ صدق می‌کنند. در این مقاله، با الهام از این مدول، برای R -مدولهای M و N ، زیرمدول (d, J) -تاب $\Gamma_{d,J}(M, N)$ از $\text{Hom}_R(M, N)$ را تعریف کرده و برای هر عدد صحیح نامنفی i ، i -امین فانکتور مشتق شده راست آن را با $H_{d,J}^i(M, -)$ نشان داده و برخی ویژگی‌های آن را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. همچنین با تعریف مجموعه‌های ایده‌الی $W(d, J)$ و $\tilde{W}(d, J)$ ، قضایایی را در خصوص ایده‌الهای اول وابسته $H_{d,J}^i(M, N) = 0$ بیان کرده و اثبات می‌نمائیم. در نهایت تحت شرایطی نشان می‌دهیم $H_{d,J}^i(M, N) = 0$.

واژه‌های کلیدی: (d, J) -کوهمولوژی، ایده‌الهای اول وابسته، (d, J) -تاب

رده‌بندی ریاضی: 13D45, 13E05, 14B15

۱ مقدمه

در سراسر این مقاله، R یک حلقه یکدار، جابجایی و نوتری و d عدد صحیح نامنفی می‌باشد. فرض کنید

$$\Sigma = \{\mathfrak{a} \trianglelefteq R \mid \dim(R/\mathfrak{a}) \leq d\}.$$

^۱نویسنده مسئول مقاله

(M. Sayedsadeghi) m_sayedsadeghi@pnu.ac.ir, (M. Masoudi Porlir) masoudi.424@student.pnu.ac.ir

(M. Sadeghi) my.sadeghi@pnu.ac.ir

آشکارا Σ یک سیستم ایده‌الی است. بانیکا و همکاران در [۱]، $H_d^i(-) = \lim_{\substack{\longrightarrow \\ \mathfrak{a} \in \Sigma}} \text{Ext}_R^i(R/\mathfrak{a}, -)$ را با عنوان i -مین d -کوهمولوژی

موضعی تعریف کردند و مطالعاتی را روی آن انجام دادند. همچنین ناصر زمانی، محمدحسن بیژن زاده و میرصادق سیدصادقی در [۷] و [۸] مطالعات تکمیلی در خصوص $H_d^i(M)$ انجام دادند و با تعمیم d -کوهمولوژی موضعی معمولی به $H_d^i(M, N)$ روی دو R -مدول M و N ، قضایایی را بیان کرده و اثبات نمودند.

همچنین تاکاهاشی و همکاران در [۶] مطالعاتی را روی کوهمولوژی موضعی با تاکید بر جفت ایده‌ال (I, J) انجام دادند و در خصوص صفر شدن و صفر ناشدن $H_{I,J}^i(M)$ و نیز ارتباط آن با کوهمولوژی معمولی قضایایی را بیان کرده و اثبات نمودند. لیژونگ چو نیز در [۳] و [۴] برخی ویژگیهای $H_{I,J}^i(M)$ را روی حلقه موضعی $(R, \mathfrak{m})$ مورد بررسی قرار دادند. برای R -مدول M و ایده‌ال J از R ، زیرمدول (d, J) -تاب، $\Gamma_{d,J}(M)$ از M را به شکل

$$\Gamma_{d,J}(M) = \{x \in M \mid \exists I \in \Sigma; Ix \subseteq Jx\}$$

معرفی می‌کنیم و برای $i \in \mathbb{N}$ ، $H_{d,J}^i(-)$ را به عنوان i -مین فانکتور مشتق شده راست $\Gamma_{d,J}(-)$ در نظر می‌گیریم. به راحتی می‌توان دید برای R -مدول M ، $x \in \Gamma_{d,J}(M)$ اگر و فقط اگر $I \in \Sigma$ موجود باشد که $I \subseteq \text{Ann}_R(x) + J$ به وضوح $\Gamma_{d,J}(-)$ یک فانکتور همورد خطی دقیق چپ از کاتگوری R -مدولها است و $\Gamma_{d,J}(\Gamma_{d,J}(M)) = \Gamma_{d,J}(M)$ همچنین در حالت خاص $J = 0$ ، خواهیم داشت $\Gamma_{d,J}(M) = L_d(M)$ که در [۸] معرفی شده است. در اینجا، دو مجموعه ایده‌الی $W(d, J)$ و $\tilde{W}(d, J)$ را به شکل

$$W(d, J) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(R) \mid \exists I \in \Sigma; I \subseteq \mathfrak{p} + J\}$$

9

$$\tilde{W}(d, J) = \{\mathfrak{a} \trianglelefteq R \mid \exists I \in \Sigma; I \subseteq \mathfrak{a} + J\}$$

تعریف می‌کنیم. بنا به [۲، ص. ۲۱]، $\tilde{W}(d, J)$ یک سیستم ایده‌الی است و برای $J = 0$ ، همان سیستم ایده‌الی Σ می‌شود. در اینجا، برای R -مدولهای M و N ، زیرمدول (d, J) -تاب $\Gamma_{d,J}(M, N)$ از $\text{Hom}_R(M, N)$ را معرفی می‌نمائیم. برای هر R -مدول M ، $\Gamma_{d,J}(M, -)$ یک فانکتور همورد خطی دقیق چپ از کاتگوری R -مدولها است و i -مین فانکتور مشتق شده راست آن را با $H_{d,J}^i(M, -)$ نشان می‌دهیم. بدیهی است اگر $M = R$ باشد آنگاه خواهیم داشت $\Gamma_{d,J}(M, N) = \Gamma_{d,J}(N)$ و از این رو برای هر $i \in \mathbb{N}$ ، $H_{d,J}^i(R, N) = H_{d,J}^i(N)$. در این مقاله به بررسی برخی ویژگیهای $H_{d,J}^i(M, N)$ پرداخته و تحت شرایطی، قضایایی را در خصوص ایده‌الهای اول وابسته و همچنین صفر شدگی آن بیان کرده و اثبات می‌کنیم.

۲ مفاهیم اولیه از (d, J) -کوهمولوژی موضعی و ایده‌الهای اول وابسته

تعریف ۱.۲. فرض کنید M و N دو R -مدول دلخواه باشند. در این صورت $\Gamma_{d,J}(M, N)$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\Gamma_{d,J}(M, N) = \Gamma_{d,J}(\text{Hom}_R(M, N)).$$

آشکار است که در حالت $M = R$ داریم:

$$\Gamma_{d,J}(R, N) = \Gamma_{d,J}(\text{Hom}_R(R, N)) = \Gamma_{d,J}(N).$$

برای هر R -مدول M ، $\Gamma_{d,J}(M, -)$ یک فانکتور همورد دقیق چپ از کاتگوری R -مدولها به خودش است. برای هر عدد صحیح نامنفی i ،

$$H_{d,J}^i(M, -) = \mathcal{R}^i(\Gamma_{d,J}(M, -))$$

نشان‌دهنده i -مین فانکتور مشتق شده راست فانکتور $\Gamma_{d,J}(M, -)$ است.

لم ۲.۲. فرض کنید M یک R -مدول با تولید متناهی و N یک R -مدول دلخواه باشد. در این صورت

$$\Gamma_{d,J}(M, N) = \text{Hom}_R(M, \Gamma_{d,J}(N)).$$

اثبات. فرض کنید $f \in \Gamma_{d,J}(M, N)$. در این صورت $I \in \Sigma$ وجود دارد که برای هر $x \in M$ داریم:

$$f(x)I \subseteq f(x)J.$$

بنابراین برای هر $x \in M$ $f(x) \in \Gamma_{d,J}(N)$ و از این رو

$$f \in \text{Hom}_R(M, \Gamma_{d,J}(N)).$$

حال فرض کنید

$$f \in \text{Hom}_R(M, \Gamma_{d,J}(N)).$$

فرض کنید $M = \langle x_1, x_2, \dots, x_t \rangle$. پس برای هر $1 \leq i \leq t$ ، $f(x_i) \in \Gamma_{d,J}(M)$ و از این رو

$$\exists I_i \in \Sigma; f(x_i)I_i \subseteq f(x_i)J.$$

قرار می دهیم $I = I_1 I_2 \dots I_t$. بدیهی است که $I \in \Sigma$ و نیز برای هر $x \in M$

$$f(x).I \subseteq f(x).J.$$

بنابراین $f.I \subseteq f.J$ و در نتیجه

$$f \in \Gamma_{d,J}(\text{Hom}_R(M, N)).$$

□

قضیه ۳.۲. فرض کنید M یک R -مدول دلخواه باشد. در این صورت برای هر $i \in \mathbb{N}_0$

$$H_{d,J}^i(M) = \varinjlim_{\alpha \in \tilde{W}(d,J)} H_{\alpha}^i(M).$$

اثبات. بنا به [۲، تمرین ۴.۳.۱] کافی است نشان دهیم

$$\Gamma_{d,J}(M) = \varinjlim_{\alpha \in \tilde{W}(d,J)} \Gamma_{\alpha}(M).$$

برای این کار، از آنجایی که $\tilde{W}(d, J)$ یک سیستم ایده‌آلی است نشان می دهیم $\Gamma_{d,J}(M) = \bigcup_{\alpha \in \tilde{W}(d,J)} \Gamma_{\alpha}(M)$. فرض کنید $x \in \Gamma_{d,J}(M)$ بنابراین $I \in \Sigma$ وجود دارد که $I \subseteq \text{Ann}_R(x) + J$. فرض کنید $\alpha = \text{Ann}(x)$. در این صورت $x \in \Gamma_{\alpha}(M)$ و $\alpha \in \tilde{W}(d, J)$.

برای عکس شمول، فرض کنید $x \in \bigcup_{\alpha \in \tilde{W}(d,J)} \Gamma_{\alpha}(M)$ بنابراین $\alpha \in \tilde{W}(d, J)$ وجود دارد که در آن $x \in \Gamma_{\alpha}(M)$. فرض کنید $I \in \Sigma$ و عدد صحیح نامنفی n چنان باشند که $I \subseteq \alpha + J$ و $\alpha^n x = 0$. بنابراین $\alpha^n x = 0$ و $I^n x \subseteq (\alpha + J)^n x \subseteq \alpha^n x + J^n x = 0 + J^n x = J^n x$. بنابراین $I^n x \subseteq J^n x$ و از این رو $I^n x \subseteq J^n x$ و $x \in \Gamma_{d,J}(M)$ و حکم تمام است. □

لم ۴.۲. فرض کنید E یک R -مدول انژکتیو باشد. در این صورت $\Gamma_{d,J}(E)$ نیز چنین است.

اثبات. بنا به قضیه ۳.۲، $\Gamma_{d,J}(E) = \varinjlim_{\alpha \in \tilde{W}(d,J)} \Gamma_{\alpha}(E)$. چون E انژکتیو است، پس برای هر ایده‌آل α به ویژه هر $\alpha \in \tilde{W}(d, J)$

$\Gamma_{\alpha}(E)$ نیز انژکتیو است. حال چون R حلقه نوتری است، پس بنا [۵، ص ۲۵۶ (تمرین ۳۵.۵)]، $\Gamma_{d,J}(E)$ نیز انژکتیو است. □

لم ۵.۲. فرض کنید M و N دو R -مدول و M با تولید متناهی باشند. در این صورت احکام زیر برقرارند.
(۱) فرض کنید E° یک تحلیل انژکتیو از N باشد، در این صورت

$$H_{d,J}^i(M, N)_{i \in \mathbb{N}_0} \cong H^i(\Gamma_{d,J}(\text{Hom}_R(M, E^\circ)))_{i \in \mathbb{N}_0}.$$

به ویژه

$$(H_{d,J}^i(M, N))_{i \in \mathbb{N}_0} \cong (H^i(\text{Hom}_R(M, \Gamma_{d,J}(E^\circ))))_{i \in \mathbb{N}_0}.$$

(۲) اگر $\Gamma_{d,J}(N) = N$ ، آنگاه برای هر $i \geq 0$ ،

$$H_{d,J}^i(M, N) \cong \text{Ext}_R^i(M, N).$$

(۳) اگر $pd(M) = t$ ، آنگاه برای هر $i > t$ ،

$$H_{d,J}^i(M, N) \cong H_{d,J}^i(M, N/\Gamma_{d,J}(N)).$$

(۴)

$$H_{d,J}^i(M, N) \cong \varinjlim_{\alpha \in \tilde{W}(d,J)} H_{\alpha}^i(M, N).$$

اثبات. (۱) قسمت اول بدیهی است. برای قسمت دوم از یکرختی زیر استفاده می‌کنیم

$$\Gamma_{d,J}(\text{Hom}_R(M, E^\circ)) \cong \text{Hom}_R(M, \Gamma_{d,J}(E^\circ)).$$

(۲) فرض کنید E° یک تحلیل انژکتیو از N باشد که $\Gamma_{d,J}(E^\circ) = E^\circ$. اکنون از قسمت (۱) داریم:

$$\begin{aligned} H_{d,J}^i(M, N) &\cong H^i(\text{Hom}_R(M, \Gamma_{d,J}(E^\circ))) \\ &= H^i(\text{Hom}_R(M, E^\circ)) \\ &\cong \text{Ext}_R^i(M, N). \end{aligned}$$

(۳) از دنباله دقیق کوتاه

$$0 \rightarrow \Gamma_{d,J}(N) \rightarrow N \rightarrow N/\Gamma_{d,J}(N) \rightarrow 0,$$

دنباله دقیق

$$H_{d,J}^i(M, \Gamma_{d,J}(N)) \rightarrow H_{d,J}^i(M, N) \rightarrow H_{d,J}^i(M, N/\Gamma_{d,J}(N)) \rightarrow H_{d,J}^{i+1}(M, \Gamma_{d,J}(N))$$

به‌دست می‌آید. فرض کنید $i > t = pd(M)$ از آنجایی که $\Gamma_{d,J}(\Gamma_{d,J}(N)) = \Gamma_{d,J}(N)$ ، پس از (۲) داریم

$$H_{d,J}^i(M, \Gamma_{d,J}(N)) \cong \text{Ext}_R^i(M, \Gamma_{d,J}(N)) = 0.$$

بنابراین برای هر $i > t = pd(M)$

$$H_{d,J}^i(M, N) \cong H_{d,J}^i(M, N/\Gamma_{d,J}(N)).$$

(۴) بنا به لم ۲.۲ و قضیه ۳.۲ داریم:

$$\begin{aligned} \Gamma_{d,J}(M, N) &= \text{Hom}_R(M, \Gamma_{d,J}(N)) \\ &\cong \text{Hom}_R(M, \varinjlim_{\alpha \in \tilde{W}(d,J)} \Gamma_{\alpha}(N)) \\ &\cong \varinjlim_{\alpha \in \tilde{W}(d,J)} \text{Hom}_R(M, \Gamma_{\alpha}(N)) \\ &\cong \varinjlim_{\alpha \in \tilde{W}(d,J)} \Gamma_{\alpha}(M, N). \end{aligned}$$

□

اکنون حکم از یکرختی اخیر به‌دست می‌آید.

قضیه ۶.۲. فرض کنید M یک R -مدول با تولید متناهی و N یک R -مدول باشد. در این صورت

$$\text{Ass}(\Gamma_{d,J}(M, N)) = \text{Supp}(M) \cap \text{Ass}(N) \cap W(d, J).$$

اثبات. از آنجایی که M یک R -مدول با تولید متناهی است پس برای هر R -مدول K ,

$$\text{Ass}(\text{Hom}_R(M, K)) = \text{Supp}(M) \cap \text{Ass}(K).$$

اکنون بنا به تعریف ۲.۱ و لم ۲.۲ داریم:

$$\begin{aligned} \text{Ass}(\Gamma_{d,J}(M, N)) &= \text{Ass}(\Gamma_{d,J}(\text{Hom}_R(M, N))) \\ &= \text{Ass}(\text{Hom}_R(M, \Gamma_{d,J}(N))) \\ &= \text{Supp}(M) \cap \text{Ass}(\Gamma_{d,J}(N)) \\ &= \text{Supp}(M) \cap \text{Ass}(N) \cap W(d, J). \end{aligned}$$

□

قضیه ۷.۲. فرض کنید M یک R -مدول با تولید متناهی و N یک R -مدول باشد. همچنین فرض کنید J و J' دو ایده آل و d و d' دو عدد دلخواه باشند. در این صورت

$$\begin{aligned} (۱) \quad & \Gamma_{d,J}(\Gamma_{d',J'}(M, N)) = \Gamma_{d',J'}(\Gamma_{d,J}(M, N)) \\ (۲) \quad & \Gamma_{d',J'}(M, N) \subseteq \Gamma_{d,J}(M, N) \text{ اگر } d \leq d' \text{ آنگاه} \\ (۳) \quad & \Gamma_{d,J}(M, N) \subseteq \Gamma_{d',J'}(M, N) \text{ اگر } J \subseteq J' \text{ آنگاه} \\ (۴) \quad & \Gamma_{d,J}(\Gamma_{d,J'}(M, N)) = \Gamma_{d,JJ'}(M, N) = \Gamma_{d,J \cap J'}(M, N) \\ & \text{به ویژه برای هر } i \in \mathbb{N}_0, H_{d,JJ'}^i(M, N) = H_{d,J \cap J'}^i(M, N) \\ (۵) \quad & \text{اگر } \sqrt{J} = \sqrt{J'} \text{ آنگاه برای هر } i \in \mathbb{N}_0, H_{d,J}^i(M, N) = H_{d,J'}^i(M, N). \end{aligned}$$

اثبات. در این جا قسمت (۴) را اثبات می کنیم. اثبات بقیه به طور مشابه است. برای این کار فرض کنید X یک R -مدول دلخواه باشد. فرض کنید $x \in \Gamma_{d,J}(\Gamma_{d,J'}(X))$. بنابراین ایده آلهای $I_1 \in \Sigma$ و $I_2 \in \Sigma$ موجودند که $I_1 x \subseteq Jx$ و $I_2 x \subseteq J'x$. در نتیجه $I_1 I_2 x \subseteq J \cap J' x$. از آنجایی که $I_1 I_2 \in \Sigma$ پس $x \in \Gamma_{d,J \cap J'}(X)$. بنابراین

$$\Gamma_{d,J}(\Gamma_{d,J'}(X)) \subseteq \Gamma_{d,J \cap J'}(X).$$

همچنین چون $JJ' \subseteq J \cap J'$ پس $\Gamma_{d,JJ'}(X) \subseteq \Gamma_{d,J \cap J'}(X)$. اکنون فرض کنید $y \in \Gamma_{d,J \cap J'}(X)$. پس $I \in \Sigma$ موجود است که $Iy \subseteq J \cap J'x$. بنابراین $Iy \subseteq Jy$ و $Iy \subseteq J'y$. در نتیجه $y \in \Gamma_{d,J}(\Gamma_{d,J'}(X))$ و این یعنی

$$\Gamma_{d,J}(\Gamma_{d,J'}(X)) = \Gamma_{d,JJ'}(X) = \Gamma_{d,J \cap J'}(X).$$

اکنون بنا بر ویژگی های $\Gamma_{d,J}(-)$ ، داریم:

$$\begin{aligned} \Gamma_{d,J}(\Gamma_{d,J'}(M, N)) &= \Gamma_{d,J}(\Gamma_{d,J'}(\text{Hom}_R(M, N))) \\ &= \Gamma_{d,JJ'}(\text{Hom}_R(M, N)) \\ &= \Gamma_{d,J \cap J'}(\text{Hom}_R(M, N)). \end{aligned}$$

اکنون با توجه به تساوی های

$$\Gamma_{d,JJ'}(\text{Hom}_R(M, N)) = \Gamma_{d,JJ'}(M, N)$$

۹

$$\Gamma_{d,J \cap J'}(\text{Hom}_R(M, N)) = \Gamma_{d,J \cap J'}(M, N),$$

□

حکم تمام است.

قضیه ۸.۲. فرض کنید M یک R -مدول با تولید متناهی و N یک R -مدول J -تاب باشد. در این صورت برای هر $i \in \mathbb{N}_0$

$$H_{d,J}^i(M, N) \cong H_d^i(M, N).$$

اثبات. ابتدا نشان می‌دهیم $\Gamma_{d,J}(M, N) = L_d(M, N)$. آشکارا $L_d(N) \subseteq \Gamma_{d,J}(N)$. اکنون فرض کنید $x \in \Gamma_{d,J}(N)$ بنابراین

$$\exists I \in \Sigma; Ix \subseteq Jx.$$

از طرفی چون $\Gamma_J(N) = N$ ، پس $x \in \Gamma_J(N)$ و از این‌رو

$$\begin{aligned} \exists t \in \mathbb{N}; J^t x &= 0 \\ \Rightarrow I^t x &= 0 \Rightarrow x \in L_d(N). \end{aligned}$$

بنابراین $\Gamma_{d,J}(N) = L_d(N)$ و در نتیجه

$$\begin{aligned} \Gamma_{d,J}(M, N) &= \text{Hom}_R(M, \Gamma_{d,J}(N)) \\ &= \text{Hom}_R(M, L_d(N)) \\ &= L_d(M, N). \end{aligned}$$

اکنون بنا به [۱۰۲، ۷] و استفاده از فانکتورهای مشتق شده راست، برای هر $i \in \mathbb{N}_0$

$$H_{d,J}^i(M, N) \cong H_d^i(M, N).$$

□

قضیه ۹.۲. فرض کنید M یک R -مدول با تولید متناهی و N یک R -مدول دلخواه باشد. در این صورت برای هر عدد صحیح نامنفی t داریم:

$$\text{Ass}(H_{d,J}^t(M, N)) \subseteq \bigcup_{j=0}^t \text{Ass}(\text{Ext}_R^j(M, H_{d,J}^{t-j}(N))).$$

اثبات. فرض کنید $G(-) = \Gamma_{d,J}(-)$ و $F(-) = \text{Hom}_R(M, -)$ کاتگوری R -مدول‌ها به خودش باشند. واضح است که $FG = \Gamma_{d,J}(M, -)$ و F فانکتور دقیق چپ است. از طرفی برای هر R -مدول انژکتیو E ، $\Gamma_{d,J}(E)$ انژکتیو است و برای هر $i > 0$

$$\mathcal{R}^i F(G(E)) = \mathcal{R}^i \text{Hom}_R(M, \Gamma_{d,J}(E)) = 0.$$

از این‌رو بنا به [۴۷.۱، ۵]، قضیه ۹.۲، دنباله طیفی به صورت

$$E_{\mathcal{V}}^{p,q} := \text{Ext}_R^p(M, H_{d,J}^q(N)) \Rightarrow_p H_{d,J}^{p+q}(M, N)$$

موجود است. برای هر $i \geq 2$ و هر $j \leq t$ ، دنباله دقیق

$$0 \rightarrow \text{Ker}(d_i^{j,t-j}) \rightarrow E_i^{j,t-j} \xrightarrow{d_i^{j,t-j}} E_i^{j+i,t-i+1-j}(*).$$

را در نظر می‌گیریم. از آنجا که

$$E_i^{j,t} = \frac{\text{Ker}(E_i^{j,t-j} \rightarrow E_i^{j+i,t-i+1-j})}{\text{Im}(E_i^{j-i,t+i-1-j} \rightarrow E_i^{j,t-j})}$$

و برای هر $j < 0$ ، $E_i^{i,j} = 0$ پس از دنباله دقیق (*) نتیجه می‌گیریم که برای هر $j \leq t$ ،

$$\text{Ker}(d_{t+2}^{j,t-j}) \cong E_{t+2}^{j,t-j} \cong E_{t+3}^{j,t-j} \cong \dots \cong E_{\infty}^{j,t-j}.$$

حال فیلترسازی متناهی

$$0 = \Phi^{t+1} H^t \subseteq \Phi^t H^t \subseteq \dots \subseteq \Phi^1 H^t \subseteq \Phi^0 H^t = H^t$$

از $H^t = H_{d,J}^t(M, N)$ را که در آن $E_{\infty}^{j,t-j} = \frac{\Phi^j H^t}{\Phi^{j+1} H^t}$ است در نظر می‌گیریم. برای هر $j \leq t$ داریم:

$$E_{\infty}^{j,t-j} \cong \text{Ker}(d_{t+2}^{j,t-j}) \subseteq \text{Ker}(d_{t+3}^{j,t-j}) \subseteq E_{t+3}^{j,t-j}.$$

اکنون برای هر $t \leq j \leq \circ$ ، از دنباله دقیق کوتاه

$$\circ \rightarrow \Phi^{j+1} H^t \rightarrow \Phi^j H^t \rightarrow E_{\infty}^{j,t-j} \rightarrow \circ$$

داریم:

$$\begin{aligned} \text{Ass}(\Phi^j H^t) &\subseteq \text{Ass}(\Phi^{j+1} H^t) \cup \text{Ass}(E_{\infty}^{j,t-j}) \\ &\subseteq \text{Ass}(\Phi^{j+1} H^t) \cup \text{Ass}(E_{\checkmark}^{j,t-j}) \\ &\Rightarrow \text{Ass}(H_{d,J}^t(M, N)) \subseteq \text{Ass}(\Phi^1 H^t) \cup \text{Ass}(E_{\checkmark}^{\circ,t}) \\ &\subseteq \text{Ass}(\Phi^{\checkmark} H^t) \cup \text{Ass}(E_{\checkmark}^{1,t-1}) \cup \text{Ass}(E_{\checkmark}^{\circ,t}) \\ &\subseteq \dots \subseteq \text{Ass}(\circ) \cup \text{Ass}(E_{\checkmark}^{t,\circ}) \cup \dots \cup \text{Ass}(E_{\checkmark}^{\circ,t}). \end{aligned}$$

بنابراین

$$\begin{aligned} \text{Ass}(H_{d,J}^t(M, N)) &\subseteq \bigcup_{j=\circ}^t \text{Ass}(E_{\checkmark}^{j,t-j}) \\ &= \bigcup_{j=\circ}^t \text{Ass}(\text{Ext}_R^j(M, H_{d,J}^{t-j}(N))). \end{aligned}$$

□

نتیجه ۱۰.۲. فرض کنید M و N ، دو R -مدول با تولید متناهی و $\Gamma_{d,J}(N) = N$ باشد. در این صورت به ازای هر عدد صحیح نامنفی t ،

$$|\text{Ass}(H_{d,J}^t(M, N))| < \infty.$$

اثبات. از آنجائی که $\Gamma_{d,J}(N) = N$ پس برای هر $i \geq 1$ ، $H_{d,J}^i(N) = \circ$ اکنون از قضیه ۹.۲ داریم:

$$\begin{aligned} |\text{Ass}(H_{d,J}^t(M, N))| &\leq |\text{Ass}(\text{Ext}_R^t(M, \Gamma_{d,J}(N)))| \\ &= |\text{Ass}(\text{Ext}_R^t(M, N))| < \infty. \end{aligned}$$

□

قضیه ۱۱.۲. فرض کنید M یک R -مدول با تولید متناهی و N یک R -مدول دلخواه باشد. اگر $pd(M) < \infty$ آنگاه برای هر $H_{d,J}^i(M, N) = \circ$ ، $i > pd(M) + \dim_R(N)$

اثبات. بنا به [۴۷.۱۰، قضیه ۵]، دنباله طیفی به صورت

$$H_{d,J}^i(\text{Ext}_R^j(M, N)) \Rightarrow H_{d,J}^{i+j}(M, N)$$

موجود است. اگر $j > pd(M)$ پس $\text{Ext}_R^j(M, N) = \circ$ حال فرض کنیم $i > \dim(N)$ از آنجائی که

$$\dim_R(\text{Ext}_R^j(M, N)) \leq \dim_R(N)$$

بنابراین $i > \dim(\text{Ext}_R^j(M, N))$ و از این رو برای هر $\mathfrak{a} \in \tilde{W}(d, J)$

$$H_{\mathfrak{a}}^i(\text{Ext}_R^j(M, N)) = \circ$$

و در نتیجه برای هر $i > \dim_R(N)$ ، داریم $H_{d,J}^i(\text{Ext}_R^j(M, N)) = \circ$ بنابراین برای هر $i+j > pd(M) + \dim_R(N)$ و $H_{d,J}^{i+j}(M, N) = \circ$ حکم تمام است. □

قضیه ۱۲.۲. فرض کنید R یک حلقه نیم‌موضعی و M و N دو R -مدول با تولید متناهی و $p := \text{pd}(M) < \infty$ باشند. در این صورت اگر

$$H_{d,J}^{p+1}(M, N), H_{d,J}^{p+2}(M, N), \dots, H_{d,J}^{p+\dim_R(N)}(M, N)$$

همگی R -مدول‌های با تولید متناهی باشند، آنگاه برای هر $i > p$ $H_{d,J}^i(M, N) = 0$.

اثبات. فرض کنید $\mathfrak{m}_1, \mathfrak{m}_2, \dots, \mathfrak{m}_n$ ایده‌آل‌های ماکزیمال R باشند. بنا به قسمت (۳) لم ۵.۲ فرض می‌کنیم $\Gamma_{d,J}(N) = 0$. بنابراین $\bigcap_{i=1}^n \mathfrak{m}_i \not\subseteq Z_R(N)$. اکنون فرض کنید $x \in \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{m}_i \setminus Z_R(N)$. اثبات را به استقراء روی $t := \dim_R(N)$ انجام می‌دهیم. اگر $t = 0$ آنگاه حکم بنا به قضیه ۳.۲ تمام است. فرض کنیم $t > 0$ و حکم برای هر R -مدول X تحت شرایط $\dim_R(X) \leq t-1$ برقرار باشد. دنباله دقیق کوتاه

$$0 \rightarrow N \xrightarrow{x} N \rightarrow N/xN \rightarrow 0$$

دنباله دقیق

$$\dots \rightarrow H_{d,J}^{p+i}(M, N) \xrightarrow{x} H_{d,J}^{p+i}(M, N) \rightarrow H_{d,J}^{p+i}(M, N/xN) \rightarrow H_{d,J}^{p+i+1}(M, N) \rightarrow \dots$$

را برای هر $i \geq 1$ نتیجه می‌دهد و از این‌رو برای هر عدد صحیح $1 \leq i < \dim_R(N)$ ، $H_{d,J}^{p+i}(M, N/xN)$ با تولید متناهی است. از آنجا که $\dim_R(N/xN) = t-1$ پس بنا به فرض استقراء برای هر $i \geq 1$ $H_{d,J}^{p+i}(M, N/xN) = 0$. بنابراین دنباله

$$H_{d,J}^{p+i}(M, N) \xrightarrow{x} H_{d,J}^{p+i}(M, N) \rightarrow 0$$

برای هر $i \geq 1$ دقیق است. از این‌رو برای هر $i \geq 1$

$$H_{d,J}^{p+i}(M, N) \cong xH_{d,J}^{p+i}(M, N)$$

□

و در نتیجه بنا به لم ناکایاما، برای هر $i \geq 1$ $H_{d,J}^{p+i}(M, N) = 0$ و حکم تمام است.

۳ نتیجه‌گیری

فرض کنید M یک R -مدول با تولید متناهی و N یک R -مدول دلخواه باشد. در این صورت برای هر (d, J) $i \in \mathbb{N}$ - کوهمولوژی موضعی تعمیم یافته $H_{d,J}^i(M, N)$ حد مستقیمی از $H_{\mathfrak{a}}^i(M, N)$ روی $\tilde{W}(d, J)$ است. همچنین ایده‌آل‌های اول وابسته $H_{d,J}^0(M, N)$ برابر با اشتراک $\text{Supp}(M)$ ، $\text{Ass}(N)$ و $\tilde{W}(d, J)$ می‌باشد. در صورتی که اگر بعد تصویری M متناهی باشد آنگاه برای هر $i > \text{pd}(M) + \dim_R(N)$ ، $H_{d,J}^i(M, N) = 0$. بعلاوه اگر (d, J) - تاب نیز باشد در آن صورت ساختار $H_{d,J}^i(M, N)$ همان ساختار $\text{Ext}_R^i(M, N)$ برای هر $i \in \mathbb{N}$ می‌باشد و در صورت با تولید متناهی بودن N نیز، ایده‌آل‌های اول وابسته $H_{d,J}^i(M, N)$ متناهی می‌باشند.

فهرست منابع

- [1] Banica, C. and Stoia M., 1976. Singular sets of a module on local cohomology. *Boll. Un. Mat. Ital. B.*, 16, pp. 923-934.
- [2] Brodmann, N.P. and Sharp, R.Y., 1998. Local Cohomology- An Algebraic Introduction with Geometric Applications. *Cambridge University Press*. doi: 10.1017/CBO9780511629204
- [3] Chu, L., 2011. Top local cohomology modules with respect to a pair of ideals. *Proc. Amer. Math. Soc.*, 139, pp. 777-782. doi: 10.1090/s0002-9939-2010-10471-9

- [4] Chu, L. and Wang, Q., 2009. Some results on local cohomology modules defined by a pair of ideals. *J. Math. Kyoto Univ.*, 49, pp. 193-200. doi: 10.1215/kjm/1248983036
- [5] Rotman J., 1979. Introduction to homological algebra. *Academic Press*. doi: 10.1007/978-0-387-68324-9
- [6] Takahashi, R., Yoshino, Y., and Yoshizawa, T., 2009. Local cohomology based on a nonclosed support defined by a pair of ideals. *J. Pure. Appl. Algebra*, 213, pp. 582-600. doi: 10.1016/j.jpaa.2008.09.008
- [7] Zamani, N., Bijan-zadeh, M.H. and Sayedsadeghi, M.S., 2016. cohomology with supports of dimension $\leq d$. *Journal of Algebra and Its Applications*, 15, pp. 1650042(1)-1650051(10). doi: 10.1142/S0219498816500420
- [8] Zamani, N., Bijan-zadeh, M.H. and Sayedsadeghi, M.S., 2013. d -Transform Functor and Some Finiteness and Isomorphism Results. *Vie. J. Math.*, 41, pp. 179-186. doi: 10.1007/s10013-013-0042-2



Results on special cohomology modules with bounded support

Mirsadegh Sayedsadeghi⁽¹⁾², Seyedhamid Masoudi Poorlir⁽²⁾ and Miryousef Sadeghi⁽³⁾

⁽¹⁾ Department of Mathematics, Payame Noor University (PNU), P.O. Box 19395-4697, tehran, iran

⁽²⁾ Department of Mathematics, Payame Noor University (PNU), P.O. Box 19395-4697, tehran, iran

⁽³⁾ Department of Mathematics, Payame Noor University (PNU), P.O. Box 19395-4697, tehran, iran

Communicated by: Omid Ali Karamzadeh

Received: 2024/03/07

Accepted: 2025/04/06

Abstract: Let R be a commutative Noetherian ring, J an ideal of R and let d a non-negative integer. For R - module M , $\Gamma_{d,J}(M)$ containing the x of M satisfying $Ix \subseteq Jx$, for some ideals of R such as I with condition $\dim_R(R/I) \leq d$. In this paper, inspired by this module, for R modules M and N , we define the submodule (d, J) - torsion $\Gamma_{d,J}(M, N)$ of $\text{Hom}_R(M, N)$ and for any non-negative integer i , denote its i -th right derived functor by $H_{d,J}^i(M, -)$ and study some of its features. Also, by defining the $W(d, J)$, $\tilde{W}(d, J)$ sets of ideals, we express and prove theorems about the associated prime ideals of $H_{d,J}^i(M, N)$. Finally, we show under the condition that $H_{d,J}^i(M, N) = 0$.

Keywords: (d, J) - cohomology, associated prime ideals, (d, J) -torsion.



©2024 Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

²Corresponding author

E-mail addresses: m_sayedsadeghi@pnu.ac.ir (M. Sayedsadeghi) masoudi.424@student.pnu.ac.ir, (M. Masoudi Poorlir) my.sadeghi@pnu.ac.ir (M. Sadeghi)